

***Platychora ulmi* (Schleich.) Petrak [Anamorfo: *Piggottia ulmi* (Grev.) Keissler]**

Sinónimos: Del teleomorfo: *Euryachora ulmi* Fuck, *Sphaeria ulmi* Schleich. Del anamorfo: *Asteroma ulmi* Grez., *Dothidea astroidea* Berk. in Smith, *Piggottia astroidea* (Berk.) Berk. & Br., *Basiascella gallarum* Bub.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota. (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase, Loculoascomycetes.)

Descripción: Anamorfo: Conidioma acervular. Conidióforos ramificados y septados sólo cerca de su base, de color marrón claro, lisos, cilíndricos, generalmente rectos. Células conidiógenas holoblásticas, anelídicas, de color marrón claro. Conidias de color marrón claro, de pared delgada y lisa, unicelulares, con ápice obtuso y base truncada, de 8-10 x 4,5-5 µm.

Huéspedes: *Ulmus minor*.

Sintomatología: Presencia de manchas negruzcas en el limbo foliar. Estromas negros, costrosos, con aspecto de cojinetes que invaden las hojas. Por el haz, las hojas se abomban ligeramente, mientras que por el envés la manchas tienden a ser de tonalidad pardo oscura. Tras la defoliación se formarán los cuerpos fructíferos en estas zonas. Es un hongo frecuente, aunque tiene una actividad secundaria, produciendo en todo caso una otoñada precoz.

Referencias:

- Muñoz López, C., Pérez Fortea, V., Cobos Suárez, P., Hernández Alonso, R. y Sánchez Peña, G. (2003). Sanidad Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los montes. Ed. Mundi Prensa, Madrid, 576 pp.
- Sutton, B. C. (1980). The Coelomycetes. C. M. I. Kew, Surrey, England, 696 pp.