

***Venturia cerasi* Aderhold [Anamorfo: *Fusicladium cerasi* Rabenh.] Sacc.]**

**Moteado**

**Sinónimos:** Del anamorfo: *Acrosporium cerasi* Rabenh. in Braun, *Cladosporium cerasi* (Rabenh.) Aderhold, *Megacladosporium cerasi* (Rabenh.) Viennot-Bourgin.

**Taxonomía:** Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Loculoascomycetes).

**Descripción:** Teleomorfo: Pseudotecios agregados, subepidérmicos y globosos. Ascas cilíndricas, de tallo corto y con ocho ascosporas. Ascosporas de 10-14 x 4-6 µm, de color marrón pálido, con un único septo por debajo del punto medio, donde se constriñen.

Anamorfo: Conidias de 16-23 x 5-7 µm, lisas o rugosas, fusiformes, anchas, de color marrón oliváceo pálido, apuntadas en el ápice y truncadas en la base.

**Huéspedes:** Cerezo.

**Sintomatología:** Causa el moteado de la hoja y del fruto del cerezo. Pasa el invierno en hojas muertas y en ramas. Es de importancia secundaria.

**Referencias:**

- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1969). Distribution of *Venturia cerasi* Aderh. CMI Map 196, 2nd. Edition.
- Laboratorio de Criptogamia. (1943). Informe del trabajo llevado a cabo por la Estación de Fitopatología de La Coruña durante 1942. Publicación Estación Fitopatología Agrícola de La Coruña 23: 21-57.
- Sivanesan, A. and Holliday, P. (1981). *Venturia cerasi*. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria nº 706.