

***Venturia populina* (Vuill.) Fabric. [Anamorfo: *Pollaccia elegans* Servazzi]**

Sinónimos: Del teleomorfo: *Didymosphaeria populina* Vuill. Del anamorfo: *Fusicladium radiosum* (Lib.) Lind var. *balsamiferae* J. J. Davies.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota. (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Loculoascomycetes).

Descripción: Teleomorfo: Pseudotecios globosos e inmersos. Ascas cilíndricas con 8 ascosporas. Ascosporas de 18-30 x 10-16 µm, de color marrón oliváceo pálido, elípticas y septadas en el tercio inferior, donde se constriñen.

Anamorfo: Conidióforos emergen solitarios o en grupos del estroma, cilíndricos, subhialinos a hialinos y unicelulares. Conidias de 23-39 x 9-14 µm, solitarias, elípticas o fusoides, truncadas en la base, de color marrón oliváceo y con dos septos.

Huéspedes: Chopo.

Sintomatología: Causa punteado en las hojas, pudiendo llegar a causar su muerte. Produce la muerte progresiva de ramas a lo largo de la estación vegetativa.

Referencias:

- Sivanesan A. (1976). *Venturia populina*. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria n° 483.
- Torres-Juan, J. (1970). Descripción de *Venturia populina* (Vuill.) Fabric. en España. Boletín del Servicio de Plagas Forestales 13: 45-50.