

***Verticillium theobromae* (Turc.) Mason & Hughes**  
**Cigarro de la platanera**

**Sinónimos:** *Stachylidium theobromae* Turc.

**Taxonomía:** Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Hyphomycetes).

**Descripción:** Forma conidióforos hialinos, algunas veces marrones en la parte inferior, ramificados verticilarmente, con 3-6 fiálidas en cada nódulo, en cuyos extremos se forman las conidias hialinas, elipsoides a subcilíndricas, principalmente unicelulares, que miden 3-8 x 1,5-3 µm.

**Huéspedes:** Platanera.

**Sintomatología:** Marchitez y ennegrecimiento del extremo del fruto. Es una podredumbre que tiene lugar sobre el fruto almacenado.

**Referencias:**

- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1966). Distribution of *Verticillium theobromae* (Turc.) Mason & Hughes. CMI Map 146, 2nd. Edition.
- Holmes, E. (1930). The Canary banana. Banana cultivation in the Canaries. Tropical Agriculture 6: 320-325.
- Wardlaw, C.W., McGuire, L.P. (1931). The behaviour and diseases of banana in storage and transport with special references to chilling. Tropical Agriculture 8: 139-147.