

***Botryotinia draytonii* (Buddin & Wakef.) Seaver [Anamorfo: *Botrytis gladiolorum* Timm.]**

Sinónimos: Del teleomorfo: *Sclerotinia draytonii* Buddin & Wakef.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Discomycetes).

Descripción: Anamorfo: Conidias unicelulares, de aproximadamente 15 x 10 µm. Sobre los tejidos afectados también se suelen producir esclerocios negros, de 1-2 mm.

Huéspedes: Gladiolo.

Sintomatología: Sobre los bulbos aparecen focos de podredumbre parda que penetran profundamente al interior, generalmente formando una especie de rayos. El tejido afectado es esponjoso y blando. Con frecuencia la podredumbre empieza en los alrededores de la yema apical y penetra hacia abajo por la parte central del bulbo, con lo que se pudre la base y no se forma ninguna raíz.

Referencias:

- García-Jiménez, J. y Alfaro-García, A. (1985). Inspección fitosanitaria del bulbo de gladiolo: Estudio básico. Boletín del Servicio contra Plagas e Inspección Fitopatológica. Fuera de serie N° 3. 71 pp.
- Goidanich, G. (1964). Manuale di Patologia Vegetale. Vol. 2. Edizioni Agricole Bologna. 1283 pp.