

***Cercospora beticola* Sacc.**

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Hyphomycetes).

Descripción: Forma manchas de color grisáceo con un borde rojizo o púrpura sobre las hojas. Los conidióforos, sin ramificar y de color pardo oscuro, llevan conidias solitarias, hialinas, obclavadas o fusiformes, con 6-10 septos que miden 40-160 x 3,5-4,5 µm.

Huéspedes: Patata, remolacha.

Sintomatología: El primer síntoma es la aparición de un punteado rojizo que se desarrolla en manchas redondas y algo deprimidas con un halo pardo o rojizo. Cuando hay humedad suficiente, se producen conidióforos casi negros, con las conidias formando un fieltro gris irregular. Causa decaimiento de la planta.

Referencias:

- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1969). Distribution of *Cercospora beticola* Sacc. CMI Map 96, 4th. Edition.
- Del Cañizo, J. (1942). Pulverización en cultivos de patata. Datos prácticos. Boletín Patología Vegetal y Entomología Agrícola 11: 359-374.
- Domínguez García-Tejero, F. (1951). Distribución en España de las plagas y enfermedades de la remolacha. Boletín Patología Vegetal y Entomología Agrícola 18: 181-204.
- Laboratorio de Criptogamia. (1941). Informe del trabajo llevado a cabo por la Estación de Fitopatología de La Coruña durante 1939-40. Publicación Estación Fitopatología Agrícola de La Coruña 14: 35 pp.
- Rossi, V., Racca, P., Giosue, S. (1995). Geophytopathological Analysis of *Cercospora* leaf spot on sugarbeet in the Mediterranean area. Phytopathologia Mediterranea 34: 69-82.