

Citrus yellow ringspot disease
Manchas anulares amarillas de los cítricos

Sinónimos: Citrus ringspot disease.

Taxonomía: Supuesta etiología viral.

Huéspedes: Cítricos. Se ha observado en naranjo dulce, naranjo amargo y mandarino.

Sintomatología: Los síntomas de esta enfermedad se confundieron en el pasado con algunos síntomas inducidos por ciertos aislados de psoriasis; sin embargo, a diferencia de esta última, los árboles afectados por las manchas anulares amarillas no muestran descamación alguna y las manchas foliares características no ocurren en hojas jóvenes, sino en hojas viejas, ramillas y frutos. En las hojas estas manchas son fácilmente observables tanto en el haz como en el envés, presentan bordes nítidos y con frecuencia tienen forma de anillo. En los frutos, las zonas afectadas presentan color verde claro o amarillento cuando el fruto aún está verde y color amarillo o naranja pálido cuando ha alcanzado la madurez.

Transmisión: Se propaga por yemas infectadas y no se ha observado dispersión natural.

Distribución geográfica: Se ha descrito en varios países del Mediterráneo y Oriente medio y en Australia.

Referencias:

- Moreno, P. (2000). Otras virosis En: Enfermedades de los cítricos, Duran-Vila, N., Moreno, P. (eds.). Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. pp. 82-85
- Navas-Castillo, J., Moreno, P. (1993). Biological diversity of citrus ringspot isolates in Spain. Plant Pathology 42: 347-357.
- Navas-Castillo, J., Moreno, P. (1993). Citrus ringspot diseases in Spain. En: Proc. 12th Conf. International Organization of Citrus Virologists. Moreno, P., da Graça, J.V., Timmer, L.W. (eds.). IOCV, Riverside, CA. pp. 163-172.