

***Colletotrichum coccodes* (Wallr.) Hughes**

Sinónimos: *Colletotrichum atramentarium* (Berk. & Broome) Tauben., *Gloeosporium amygdalinum* Brizi

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripción: Forma acérvulos redondeados o alargados de 300 µm de diámetro, que contienen conidias cilíndricas, largas y rectas, con extremos atenuados, hialinas y aseptadas, que miden 16-24 x 2,5-4,5 µm. Forma esclerocios frecuentemente, que pueden tener setas. Se transmite por tubérculos y semillas.

Huéspedes: Berenjena, patata, tomate, almendro.

Sintomatología: Causa el punteado negro de tomate y patata, así como la podredumbre de la raíz. La infección afecta fundamentalmente a las raíces, pudiendo extenderse a las partes aéreas que estén en contacto con el suelo. En almendro, las ramas son atacadas cuando son aún herbáceas y se secan rápidamente. Los frutos presentan lesiones de color marrón y algo deprimidas en el centro. Las hojas presentan lesiones marrones que acaban por perforar el limbo.

Referencias:

- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1967). Distribution of *Colletotricum coccodes* (Wallr.) Hughes. CMI Map 190, 2nd. Edition.
- Palazón-Español, I.J., Palazón-Español, C.F. (1979). Estudios sobre *Gloeosporium amygdalinum* Brizi en los almendros españoles. Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Protección Vegetal 11: 29-43.
- Unamuno, L.M. (1933). Enumeración y distribución geográfica de los Esferopsidales conocidos en la Península Ibérica y las Islas Baleares. Memoria de la Academia de Ciencias de Madrid 4: 458.