

***Cystodendron dryophilum* (Pass.) Bubák**

Sinónimos: *Tubercularia dryophila* Pass., *Strumella dryophila* (Pass.) Sacc.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Hyphomycetes).

Descripción: Conidias unicelulares, hialinas, esféricas a ovoides, de 2-2,5 µm de diámetro, formadas en series de 3-4 por fiálida.

Huéspedes: Alcornoque (*Quercus suber*).

Sintomatología: Se ha aislado en hojas de alcornoques afectados por decaimiento, con crecimiento anual de ramas reducido, clorosis, defoliación, puntiseado, producción de brotes epicórmicos y hojas más pequeñas de lo habitual. También se observan en el tronco y en la base de estos árboles chancros y heridas.

Referencias:

- Luque, J., Parladé, J. y Pera, J. (2001). El decaimiento del alcornoque en Cataluña: síntomas y hongos asociados. *Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales* 10: 271-287.
- Marras, F. (1962). Contributi alla patologia della Quercia da sughero (*Quercus suber* L.). II. Malattie fogliari causate da funghi parassiti in Sardegna. *Stazione Sperimentale del Sughero. Tempio Pausania. Memoria* 3: 75-82.