

***Dendrophoma myriadea* (Preuss) Sacc.**

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripción: Micelio inmerso, ramificado, septado, hialino o marrón. Conidiomas separados o agregados, superficiales, negros, al principio globosos y cerrados, al final se abren y llegan a ser cupulados. Setas marrones, septadas, lisas. Conidióforos hialinos, simples o ramificados irregularmente, septados, lisos, cilíndricos. Células conidiógenas enteroblásticas, fialídicas, cilíndricas, hialinas, lisas. Conidias hialinas o marrón muy claro, aseptadas, de paredes finas, con una setula en la punta.

Huéspedes: Alcornoque (*Quercus suber*).

Sintomatología: Se ha aislado en hojas de alcornoques afectados por decaimiento, con crecimiento anual de ramas reducido, clorosis, defoliación, puntisecado, producción de brotes epicórmicos y hojas más pequeñas de lo habitual. También se detectan en el tronco y en la base de estos troncos chancros y heridas.

Referencias:

- Luque, J., Parladé, J. y Pera, J. (2001). El decaimiento del alcornoque en Cataluña: síntomas y hongos asociados. *Investigacion Agraria: Sistemas y Recursos Forestales* 10: 271-287.