

***Gibberella baccata* (Wallr.) Sacc. [Anamorfo: *Fusarium lateritium* Ness]**

Sinónimos: Del teleomorfo: *Botryosphaeria moricola* Ces. & de Not., *Gibbera baccata* (Wallr.) Fuckel, *Gibberella baccata* var. *moricola* (Ces. & de Not.) Wollenw., *G. lateritium* Snyder & Hansen, *G. moricola* (Ces. & de Not.) Sacc., *G. pulicaris* subsp. *baccata* (Wallr.) Sacc., *Sphaeria baccata* Wallr.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Pyrenomycetes).

Descripción: Forma un micelio flocooso en el que predominan los colores amarillo, naranja o pardo rojizo. Teleomorfo: Los cultivos forman a menudo estromas azul oscuro en los que puede iniciarse peritecios. Ascas cilíndricas a aclavadas, con el extremo distal redondeado. Ascosporas hialinas, fusiformes a elipsoides, de 13-18 x 5-8 µm.

Anamorfo: Microconidias ausentes. Macroconidias de 22-75 x 2,5-5 µm, ligeramente curvadas, con 3-7 septos, acuminadas en el ápice y con una célula basal pedicelada, formadas en esporodoquios que toman color naranja oscuro.

Huéspedes: Albaricoquero.

Sintomatología: Produce chancros, podredumbre de yemas y puede causar la muerte progresiva de la planta.

Referencias:

- Booth, C. (1971). *Gibberella baccata* (conidial state: *Fusarium lateritium*). CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria Nº 310.
- Carter, M.V., Price, T.V., Davison, E.M., Bumbieris, M., Clare, B.G., Dube, A.J., Johnsson, J.S., Kerr, A., Htay, K., Roberts, W.P., Francki, R.I.B., Randles, J.W., Rezaian, M.A., Habili, N., Ikegami, M. (1974). Biennial Report of the Waite Agricultural Research Institute, 1972-1973. 118 pp. Waite Agricultural Research Institute. Australia.