

***Gibberella intermedia* (Kuhlman) Samuels, Nirenberg & Seifert [Anamorfo: *Fusarium proliferatum* (Matsushima) Nirenberg]**

Sinónimos: Del teleomorfo: *Gibberella fujikuroi* mating population D., *G. fujikuroi* var. *intermedia*. Del anamorfo: *Cephalosporium proliferatum* T. Matsushima.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Pyrenomycetes).

Descripción: Anamorfo: Micelio aéreo blanco que, a veces, se tiñe de color púrpura. Clamidosporas ausentes. Microconidias abundantes, generalmente unicelulares, en forma de maza con base aplanada o, más raramente, en forma de pera, producidas en cadenas de longitud variable y en falsas cabezas, sobre mono y polifíalidas. Macroconidias abundantes, bastante rectas, con las zonas ventral y dorsal paralelas en la mayor parte de su longitud, con 3-5 tabiques. Las descripciones de la especie no citan dimensiones de micro- y macroconidias.

Huéspedes: Palmeras ornamentales de los géneros *Chamaerops*, *Phoenix*, *Trachycarpus* y *Washingtonia*.

Sintomatología: Marchitez, lesiones en la base de las hojas y muerte de plántulas.

Referencias:

- Armengol, J., Moretti, A., Vicent, A., Bengoechea, J.A. y García-Jiménez, J. (2001). Identification and incidence of *Fusarium proliferatum* on palms in Spain. Proceedings of the XIth Congress of the Mediterranean Phytopathological Union: 285-287. Évora, Portugal.
- Armengol, J., Moretti, A., Vicent, A. y García-Jiménez, J. (2002). Caracterización de *Fusarium proliferatum* en palmeras ornamentales. Resúmenes XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fitopatología: 122. Almería.
- Ferrando, V., Abad-Campos, P., Armengol, J., Moretti, A. y García-Jiménez, J. (2004). Compatibilidad vegetativa de *Fusarium proliferatum*, patógeno de palmera. Resúmenes XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fitopatología: 144. Lloret de Mar (Girona).