

***Gibberella intricans* Wollenw. [Anamorfo: *Fusarium equiseti* (Corda) Sacc.]**

Sinónimos: Del anamorfo: *F. falcatum* Appel & Wollenw., *F. gibbosum* Appel & Wollenw., *F. roseum* var. *gibbosum* (Appel & Wollenw.) Messiaen & Cassini, *F. scirpi* Lamb. & Fautr., *Selenosporium equiseti* Corda.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Pyrenomycetes).

Descripción: Teleomorfo: Peritecios superficiales, globosos a cónicos, con una pared exterior rugosa. Ascas aclavadas. Ascosporas hialinas y fusoides, con 2-3 septos, de 21-33 x 4-5,5 µm.

Anamorfo: Al principio se producen fiálidas laterales simples, aunque con el tiempo también produce conidióforos ramificados. Conidias con forma de hoz, pediceladas, con 4-7 septos y de 22-60 x 3,5-6 µm. Clamidosporas intercalares, solitarias o en pequeñas cadenas, globosas y de 7-9 µm de diámetro.

Huéspedes: Arroz, maíz.

Sintomatología: Produce la podredumbre de raíz y tallo en los cereales. Es causa secundaria de podredumbre de frutos y tubérculos en almacén.

Referencias:

- Booth, C. (1978). *Fusarium equiseti*. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria N° 571.
- Marín Sánchez, J.P., Jiménez-Díaz, R. M. (1982). Two new *Fusarium* species infecting rice in southern Spain. Plant Disease 66: 332-334.