

***Issatchenkia orientalis* Kudryavtsev [Anamorfo: *Candida krusei* (Castellani) Berkhout]**

Sinónimos: Del anamorfo: *Saccharomyces krusei* Cast., *Endomyces krusei* Cast., *Monilia krusei* (Cast) Cast & Chalmers, *Myceloblastanion krusei* (Cast.) Ota, *Trichosporon krusei* (Cast.) Ciferri & Radaelli, *Mycotoruloides krusei* (Cast.) Langeron & Guerra.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Hemiascomycetes).

Descripción: Colonias de color crema claro y lisas, con una superficie seca y márgenes lobulados, con pseudohifas ramificadas y escasas. Las células son ovoides a elongadas, simples o pareadas, con una o dos yemas en un extremo y de 2-5,5 x 4,0-15 µm.

Huéspedes: Cítricos, principalmente mandarino y naranja.

Sintomatología: Decoloración de frutos.

Referencias:

- Davis, C. (1986). *Candida krusei*. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria N° 874.
- Tuset, J.J. and Peruchó, R. (2001). First recognition of *Issatchenkia orientalis* in mature citrus fruits in Spain. Plant Disease 85: 335.