

***Neotyphodium coenophialum* (Morgan-Jones & W. Gams) Glenn, C. W. Bacon & Hanlin**

Sinónimos: *Acremonium coenophialum* Morgan-Jones & Gams.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Hyphomycetes).

Descripción: Colonias de color blanco o crema y crecimiento lento. Conidióforos rectos con forma de fialide que presentan uno o dos conidias unicelulares reniformes de 7 µm de longitud.

Huéspedes: Numerosas especies de gramíneas.

Sintomatología: No produce síntomas en las plantas infectadas. Sin embargo, representa un problema para los animales que consumen pasto infectado, ya que las plantas contienen varios alcaloides tóxicos causantes de trastornos en animales. El hongo se transmite verticalmente por semilla.

Referencias:

- Zabalgogezcoa, I., García Ciudad, A. y García Criado, B. (1998). *Neotyphodium coenophialum* en semillas de variedades forrajeras de *Festuca arundinacea*. Investigación Agraria: Producción y Protección Vegetal 13: 167-172.
- Zabalgogezcoa, I., Vázquez de Aldana, B.R., García Ciudad, A. and García Criado, B. (2003). Fungal endophytes in grasses from semi-arid permanent grassland of western Spain. Grass and Forage Sciences 58: 94-97.