

***Pestalotiopsis funerea* (Desm.) Steyaert**

Sinónimos: *Pestalotia funerea* Desm.; *Pestalotiopsis dictaeta* (Speg.) Stey.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripción: Forma, en acérvulos, conidias fusiformes, rectas o ligeramente curvadas, constreñidas en los septos, de cinco células, de 19-27 x 5-7,5 µm, con apéndices característicos (3-6 en el ápice, 1 en la base). Los acérvulos son globosos y rompen la epidermis por un poro que llega a ser ancho e irregular, de hasta 300 µm de diámetro.

Huéspedes: Ciprés.

Sintomatología: Causa tanto lesiones en las acículas como chancros. Es particularmente grave en los viveros.

Referencias:

- Fernández de Ana, F.J. (1974). Nuevos ataques a las tuyas en los viveros de Galicia. Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Recursos Naturales 1: 187-199.
- Tuset-Barrachina, J.J. (1972). Un marchitamiento y secado de hojas y ramas jóvenes de origen micológico, en el ciprés. Anales del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Protección Vegetal 2: 11-25.
- Tuset, J.J. (1980). Some pathological aspects of cypress in Spain. En (Grasso, V., Raddi, P.) The cypress: diseases and protection. European Economic Community, Agrimed.; Florence; Italy. Pp 225-230.