

***Pestalotiopsis palmarum* (Cooke) Steyaert**
Manchas en hojas de palmeras

Sinónimos: *Pestalotia palmarum* Cooke.

Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, Clase Coelomycetes).

Descripción: Acérvulos globulosos, lenticelares o elipsoides, por los que emergen los cirros a través de una abertura irregular y amplia. Conidióforos anelídicos. Conidias fusiformes, generalmente rectas, tienen tres células oscuras centrales y una terminal hialina en cada extremo, de 17-25 x 4,5-7,5 µm. Generalmente con tres apéndices apicales y uno basal más corto.

Huéspedes: Palmáceas en general, especialmente en palmera datilera, canaria y *Washingtonia*.

Sintomatología: En el raquis, acículas de las hojas y base de los peciolo aparecen pequeñas manchas negras aproximadamente de 1 cm de largo, que confluyen en amplias lesiones circulares. A medida que el hongo madura en las lesiones, éstas toman coloración blanca con el borde negro. La palmera puede presentar un aspecto enfermizo, pero sin llegar a ser causa de muerte.

Referencias:

- Montón Romans, C. (1999). *Pestalotiopsis palmarum* (Cooke) Steyaert. Manchas en hojas. Fichas de diagnóstico en laboratorio de organismos nocivos de los vegetales. Ficha 133. MAPA. Madrid.
- Morgue, J. E. M. and Holliday, P., (1971). *Pestalotiopsis palmarum*. CMI Descriptions of Pathogenic Fungi and Bacteria nº 319.