

Nueva información
***Pseudomonas asturiensis* González et al. 2013**
Mancha bacteriana de la soja

Taxonomía: *Pseudomonadota*; *Gammaproteobacteria*; *Pseudomonadales*; *Pseudomonadaceae*.

Descripción: Bacteria con forma bacilar. Gram-negativa, móvil. Aeróbica.

Huéspedes: Soja (*Glycine max*)*, vegetación arvense como reservorio (*Solanum nigrum*, *Rumex obtusifolius*)*.

*Huéspedes identificados en España.

Sintomatología: En hojas, peciolo y vainas se observan manchas de color marrón-rojizo. En condiciones climáticas adecuadas, compromete la viabilidad del cultivo.

Distribución geográfica: En España ha sido identificada en Asturias.

Referencias:

- González, A.J., Cleenwerck, I., De Vos, P., Fernández-Sanz, A.M. (2013). *Pseudomonas asturiensis* sp. nov., isolated from soybean and weeds. Systematic and Applied Microbiology 36: 320-324.
- González, A.J., Fernández-Sanz, A.M. (2014). La nueva especie bacteriana descubierta por el SERIDA, *Pseudomonas asturiensis*, es patógena en soja. Tecnología Agroalimentaria. Boletín informativo del SERIDA14: 14-15.