

***Pseudonectria rousseliana* (Mont.) Wollenw [Anamorfo: *Volutella buxi* (Corda) Berk]**

Sinónimos: del teleomorfo: *Hypomyces fulvus* (fRB.) Sacc., *Nectria rousseliana* Mont., *Nectriella rousseliana* (Mont.) Sacc., *Notarisiella rousseliana* (Mont.) Sacc ex Clem. & Shear, *Sphaeria fulva* Fr., *Stigmatea rousseliana* (Mont.) Fuckel.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota. (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Pyrenomycetes).

Descripción: Teleomorfo: peritecios de color rojizo, solitarios o agrupados en las mismas zonas ocupadas previamente por los esporodoquios.

Anamorfo: los esporodoquios aparecen como masas rosáceas que se acumulan en el envés de las hojas.

Huéspedes: Boj (*Buxus sempervirens*).

Sintomatología: Manchas necróticas de color pardo sobre las hojas; se observa la formación de hojas instaladas de forma anómala en el ramillo; aparecen chancros como pequeñas zonas deprimidas en los tallos y ramillos. La corteza está oscurecida y se desprende, el leño por debajo presenta una tonalidad parda o grisácea. El hongo provoca la muerte de las hojas como consecuencia del anillamiento de los ramillos, y puede llegar a matar a la planta.

Referencias:

- Muñoz López, C., Pérez Fortea, V., Cobos Suárez, P., Hernández Alonso, R. y Sánchez Peña, G. (2003). Sanidad Forestal. Guía en imágenes de plagas, enfermedades y otros agentes presentes en los montes. Ed. Mundi Prensa, Madrid, 576 pp.