

***Puccinia antirrhini* Dietel & Holway**

Roya

Taxonomía: Reino Fungi, Filo: Basidiomycota (División Eumycota, Subdivisión Basidiomycotina, Clase Urediniomycetes).

Descripción: Roya autoica y macrocíclica. Los uredios, separados, circulares y de color castaño, llevan urediosporas globosas, color castaño claro con 2-3 poros ecuatoriales en la pared de 1,5-2,5 µm de espesor. Las teliosporas son oblongas, obtusas, redondeadas o truncadas en la parte superior, ligeramente constreñidas en el septo y de color castaño; su pedicelo es hialino y de igual o menor tamaño que la espora; miden 30-55 x 18-29 µm. Se desconocen los picnidios y los ecios.

Huéspedes: *Antirrhinum* spp.

Sintomatología: El hongo ataca a todas las partes de la planta. Es más grave el ataque a las cápsulas, destruyendo los ovarios y la producción de semilla. Puede matar al huésped.

Referencias:

- Commonwealth Mycological Institute (C.M.I.). (1965). Distribution of *Puccinia antirrhini* Diet.& Holw. CMI Map 40, 4th. Edition.
- González Fragosó, R. (1924). Flora de la Península Ibérica. Uredinaceae. T I.– Género *Puccinia*. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.