

***Valsaria insitiva* (Tode) Ces. & de Not. [Anamorfo: *Cytospora rubescens* Fr.]**

Sinónimos: Del teleomorfo: *Valsa cincta* (Fr.) Fr., *Leucostoma cinctum* (Fr.) Höhn. y numerosos sinónimos más englobados en los géneros *Diatrype*, *Dothidea*, *Pseudovalsa*, *Sphaeria*, *Valsa* y *Valsaria*. Del anamorfo: *Cytospora cincta* Sacc., *Leucocytospora cincta* (Sacc.) Höhn.

Taxonomía: Reino Fungi, Filo Ascomycota (División Eumycota, Subdivisión Ascomycotina, Clase Pyrenomycetes).

Descripción: Teleomorfo: Ascotromas valsoides inmersos en la peridermis de los troncos, ramas y ramas secundarias muertas. Peritecios con un ostiolo que aflora a la superficie del estroma. Ascosporas filiformes, de 16-24 x 2,5-6 µm.

Anamorfo: Ya sea por separado o, en ocasiones, en el ascotroma, se desarrollan conidiomas con conidias hialinas y alantoides de 6 µm de longitud media que son expulsadas en una masa gelatinosa.

Huéspedes: Albaricoquero, melocotonero.

Sintomatología: Ataca a las plantas previamente dañadas o sometidas a estrés, causando la infección y necrosis del floema, cámbium y xilema. Como consecuencia de esta infección, se produce apoplejía, muerte progresiva o chancro perenne y gomosis.

Referencias:

- Mateo-Sagasta, E. (2000). Chancros y secas causados por *Valsa* sp. En “Montesinos *et al.* (edit.) Enfermedades de los frutales de pepita y de hueso: 73“. SEF- Mundi-Prensa. 147 pp.
- Portilla, M.T., Tuset, J.J. (1986). Chancros de los frutales de hueso: *Leucocytospora cincta* (Sacc.) Höhn., un coelomycete activo en el melocotonero. Investigación Agraria 1: 259-269.